

КАЖАНИ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Олександр Киселюк

Карпатський національний природний парк (Яремча)

Kiseljuk O. Bats of the Carpathian national park.

Карпатський національний природний парк розташований на північному мегасхилі Української частини Східних Карпат у передгірній та гірській частині Івано-Франківської області. Парк займає площу 50,3 тис. га і охоплює всі типи екосистем цього регіону, від передгірних районів до субальпії. Загалом північні схили досліджені мало.

Відомості щодо зимового населення кажанів обмежені, оскільки на території парку немає природних чи штучних печер, придатних для зимівлі кажанів¹. Осінні спостереження, що проводились в сутінках, свідчать про ймовірно більшу видову різноманітність хіроптерофауни Парку порівняно з офіційним фактично зафікованим набором видів.

Первинні інвентаризаційні дослідження видового складу кажанів проведенні на території парку протягом 1987–1990 рр. Матеріали збирались під час обстежень будівель та старих дуплистих дерев і загалом відносяться до літнього населення. Дані про наявність десяти видів вперше для території парку наводяться в зведенні С. Стойка зі співавторами (1991). Таку саму кількість видів (але присутність двох видів визначена тільки як ймовірна) наведено і в іншій роботі (Стойко та ін., 1993). Варто зауважити, що ці два

згадані узагальнення підготовлені виключно на основі літературних даних, оскільки ніхто з авторів цих зведень спеціально хіроптерофауну не досліджував.

Загалом, з врахуванням усіх літературних даних щодо даної території (Татаринов, 1956, 1973; Крочко, 1992 та ін.), повний список хіроптерофауни нараховує достовірно дев'ять видів, всі з родини Vesptilionidae: *Myotis myotis*, *M. daubentonii*, *M. mistacinus*, *Nyctalus noctula*, *Vesptilio murinus*, *Eptesicus nilssoni*, *E. serotinus*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Plecotus auritus*. До цього часу на території парку не зафіковано жодного виду, що охороняється законом (Червона книга України, 1994).

Матеріал для цього повідомлення зібраний попутньо з іншими дослідженнями протягом 1988–1995 рр. Наявний колекційний матеріал (черепки тварин) та визначення тварин в природі (на основі екстер'єрних ознак) дають змогу константувати достовірну знахідку тільки п'яти видів кажанів, всі з родини гладконосих, Vesptilionidae. У дужках за назвою виду подано оцінку його чисельності за 3–бальною шкалою (1 – рідкісний вид, 2 – малочисельний вид, 3 –звичайний вид):

Plecotus auritus (1), *Nyctalus noctula* (1), *Pipistrellus pipistrellus* (2). *Vesptilio murinus* (1), *Eptesicus serotinus* (1).

Місця знахідок кажанів на території парку представлені на рис., а чисельність їх загалом відповідає середній у східнокарпатському регіоні.

Література

1. Крочко Ю. И. Рукокрылые Карпат. Автореф дис ... докт. бiol. наук – Киев: Ин-т зool. НАНУ, 1992. – 34с.
2. Татаринов К. А. Звірі західних областей України – К.: вид-во АН УРСР, 1956.– 188с.
3. Татаринов К. А. Fauna хребетних зоогеографічного району України – Львів: Вища шк., 1973. – 257с.
4. Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалік С. Заповідні екосистеми Карпат – Львів: Світ. – 1991. – 248 с.
5. Стойко С. М., Мілкіна Л. І., Тасенкевич Л. О. та ін. Природа Карпатського національного парку. – Київ: Наук думка – 1993. – 215с.
6. Червона книга України. Тваринний світ. – Київ: Укр. Енцикл – 1994. – 464с.

¹ Прим. ред.: Варто зауважити що у Ямнецьких печерах раніше відмічали зимові скupчення кажанів (див. цитування статті К. Татаринова(1988) у бібліографічномуглядів кінці збірки).




Рис. Місця залідок видів рукокрилих на території Карпатського НПП