



ЗАМЕТКИ

Перші знахідки багатоголкової колючки понто-каспійської (Pisces, Gasterosteidae) у водоймах Криму [First Finds of Ponto-Caspian Ninespined Stickleback (Pisces, Gasterosteidae) in Reservoirs of the Crimea]. — Багатоголкова колючка понто-каспійська, *Pungitius platygaster* (Kessler, 1859), досить звичайна риба наших водойм, в Україні поширена як у солонуватих водах Чорного і Азовського морів (зокрема і в лиманах Сасик, Дністровський, Дніпровсько-Бузький, Утлюкський, Молочний та ін.) та в пониззях і пригірлових ділянках річок (Дунай, Дністер, Півд. Буг, Дніпро, Лозоватка, Обітчна, Берда та ін.), так і в інших прісноводних водоймах (у водосховищах Дніпра, в Росі, Сулі, Пелі та ін., в Сіверському Дінці, Деркулі і т. д.). Під час експедиційних робіт 2002 р. ця риба вперше виявлена нами у водоймах Криму, де вона раніше ніким ніколи не відзначалася. Зокрема, 15.06.02 в гірловій ділянці р. Кача поблизу смт Кача (Севастопольський р-н), при проведенні волокушних ловів у прибережжі на глибинах 0,5—1,3 м було виявлено 3 ос. цієї колючки із стандартною довжиною тіла 21—23 мм. Наступного дня, 16.06.02, при проведенні аналогічних ловів в оз. Богайли (Сакський р-н, поблизу с. Фрунзе) на глибинах 0,3—1,5 м, разом з іншими рибами і підводною рослинністю, було виявлено 8 ос. колючки завдовжки 14—29 мм. За морфологічними ознаками і забарвленням всі вказані екземпляри не відрізняються від типової форми і зберігаються у фондових колекціях Зоологічного музею ННПМ НАН України під № 6698 (р. Кача) і № 6734 (оз. Богайли). За усним повідомленням О. Р. Болтачова (5.02.08), дещо пізніше цей вид виявлено також в р. Чорна. — **Ю. В. Мовчан** (Національний науково-природничий музей НАН України, Київ).

Новая находка вечерницы малой (Chiroptera) в Крыму [New Record of Leisler's Bat (Chiroptera) in the Crimea]. — Вечерница малая, *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817), — редкий вид фауны Украины: известно не более 90 регистраций (Годлевская, 2007). Вид включен в Красную книгу Украины с категорией III (Червона книга України, 1994). В Крыму этот вид в разное время с 1912 (?) по 1976 г. отмечен 10 раз. Все находки вида, кроме одной, относятся к территории бывшего Крымского государственного заповедно-охотничьего хозяйства (Пузанов, 1931; Дулицкий, 1979; Константинов и др., 1976; Дулицкий, Коваленко, 2003); один раз вид отмечен в «урочище Домузлав Евпаторийского уезда» (Браунер, 1912). В 2004 г., после 28 лет отсутствия каких-либо находок этого вида в Крыму, 6 ос. *Nyctalus leisleri* (2 ♂, 4 ♀) отловлены нами паутинной сетью, установленной над р. Кизил-Кобинка у «входа» в Кизилкобинское ущелье недалеко от впадения ручья Алешиной Воды (возле с. Перевальное, Симферопольского р-на, 19.06.04). Три из отловленных самок были беременными, что свидетельствует о размножении вида на территории Крымского полуострова. Предполагаем, что вид распространен на большей части территории горно-лесного Крыма. Отсутствие его регистраций в течение столь длительного периода, вероятно, связано с недостаточным вниманием зоологов к изучению дендрофильных видов рукокрылых региона. — **Е. В. Годлевская, М. А. Гхазали** (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев).